E. BOROS - F. FÜREDI

**SU UN TEOREMA DI KÁRTESZI
NELLA GEOMETRIA COMBINATORIA**

Estratto da « Archimede » - Fasc. 2 (1977)

FIRENZE
CASA EDITRICE FELICE LE MONNIER
1977

**SU UN TEOREMA DI KÁRTESZI
NELLA GEOMETRIA COMBINATORIA (*)**

1. - Nella presente nota proviamo un teorema di Kártesz [1], sfruttando un teorema relativo ai grafi completi orientati [2]; inoltre siamo riusciti a trovare una certa semplificazione della dimostrazione originale di Kártesz.

Consideriamo un insieme di n punti di un piano euclideo, $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ che non contenga nessuna terna di punti allineati. Diremo che tal insieme è un *sistema generale* di n punti. Sia $P \cup \{X\}$ un sistema generale di $n + 1$ punti. Il numero dei triangoli determinati da punti di P che contengono il punto X per punto interno ad essi sia indicato con simbolo $f(P, X)$. Questo numero verrà chiamato *multiplicità di ricoprimento* del punto X mediante P .

Se P è prefissato mentre X è un punto variante, il massimo valore di $f(P, X)$ sia indicato con $f(P)$. Variando P , se n è prefissato, il massimo valore di $f(P)$ - maximum maximorum - sia indicato con $U(n)$, il minimo valore di $f(P)$ - minimum maximorum - sia indicato con $u(n)$.

Un teorema di Kártesz:

$$(1.1) \quad U(n) = \frac{n^3 - n}{24}, \text{ se } n \text{ è dispari}; \quad U(n) = \frac{n^3 - 4n}{24}, \text{ se } n \text{ è pari.}$$

Egli ha trovato ancora alcuni risultati particolari:

$$(1.2) \quad u(4) = U(4), \quad u(5) = U(5), \quad u(6) = U(6), \quad u(7) < U(7).$$

Qui ci occuperemo del teorema (1.1) e daremo due dimostrazioni di esso.

2. - Un grafo completo orientato sia denotato con $T(n)$ o brevemente T . Se tre spigoli (orientati) di T formano un circuito orientato si dice *triangolo ciclico* di T . Prefissando i vertici e gli spigoli di un grafo completo disegnato, si può variare la sua orientazione. Ad ogni orientazione appartiene un numero $c(T)$, il numero dei triangoli ciclici di T . Prefissando il numero n , il maggiore dei numeri $c(T)$ sia denotato con $C(n)$. Come è noto - cfr. [2] -:

$$(2.1) \quad C(n) = \frac{n^3 - n}{24}, \text{ se } n \text{ è dispari};$$

$$(2.2) \quad C(n) = \frac{n^3 - 4n}{24}, \text{ se } n \text{ è pari.}$$

(*) Gli autori sono studenti di 3° anno dell'Università di Budapest.

Mostreremo ora un modello speciale che ha la proprietà: $c(T) = C(n)$. A tale scopo consideriamo un $2n$ -gono regolare $S_1 S_2 \dots S_{2n} = S$ inscritto in una circonferenza Γ di centro X . Ne sia ricavato un sottopoligono di n vertici

$$S_{v_1} S_{v_2} \dots S_{v_n} = P_1 P_2 \dots P_n = P$$

che non abbia due vertici diametralmente opposti. Siano i vertici di P e le corde $P_j P_k$ di Γ vertici e spigoli di un grafo completo di n vertici. Dal grafo si può derivare un grafo orientato $T(n)$ nel modo seguente: percorrendo qualunque delle corde secondo la sua direzione assegnata, il punto X stia sempre a destra. Il grafo in tal modo orientato sia denotato con $(P)^X$, cioè $T = (P)^X$. Poggiando su queste convenzioni, descriveremo il modello in questione.

Se n è dispari (fig. 1) consideriamo il sottopoligono di S :

$$S_1 S_3 \dots S_{2n-1} = P_1 P_2 \dots P_n = P.$$

Con un calcolo combinatorio relativo a P si ottiene che:

$$(2.3) \quad f(P, X) = \frac{n^3 - n}{24}.$$

Se n è pari (fig. 2) consideriamo il sottopoligono

$$S_1 S_3 \dots S_{n-1} S_{n+2} S_{n+4} \dots S_{2n} = P_1 P_2 \dots P_n = P.$$

Fig. 1.

Fig. 2.

Con un calcolo simile si risulta che:

$$(2.4) \quad f(P, X) = \frac{n^3 - 4n}{24}.$$

Confrontando le (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) e le definizioni di P e di $(P)^X$, si vede facilmente che infatti $c(T) = c((P)^X) = C(n)$.

3. — Ci resta da esaminare l'eventualità generale, cioè il caso in cui non esista una circonferenza di centro X , che passi per ogni punto di P . Tuttavia, nel caso generale esiste una circonferenza Γ di centro X , che contiene all'interno tutti i punti di P (fig. 3); e faremo vedere come si possa ricondurre il caso generale al suddetto caso speciale (n. 2).

Indicheremo per brevità con $[AB]$ la semiretta di punto iniziale A passante per B ; la semiretta complementare di $[AB]$ sia denotata con $[\overline{AB}]$; $[AB] \cup [\overline{AB}] = \langle AB \rangle$, cioè $\langle AB \rangle$ è la retta che passa per A e per B .

Fig. 3.

Facendo rotare $[XP_1]$ — dove $P_1 \in P$ — intorno ad X , essa tocca — ad uno ad uno — i punti di P . La permutazione ciclica così ottenuta sia denotata con $P_1P_2 \dots P_n$. I segmenti $P_1P_2, P_2P_3, \dots, P_nP_1$ formano il contorno di una stella (poligono) di nucleo X . Se facciamo rotare la retta totale $\langle XP_1 \rangle$, allora l'ordine delle toccate fornisce sulla circonferenza una successione di coppie di punti opposti:

$$S_1, S_{1+n}; S_2, S_{2+n}; \dots; S_n, S_{2n}.$$

Il poligono

$$S_{v_1}, S_{v_2} \dots S_{v_n} = P'_1 P'_2 \dots P'_n = P'$$

non ha coppie di vertici diametralmente opposti, essendo $P \cup \{X\}$ un sistema generale di $n + 1$ punti. L'applicazione che muta (P, X) in (P', X) (fig. 3) sia denotata con Θ . Se S^* è un $2n$ -gono regolare di centro X^* , allora Ω denoti l'ap-

plicazione che muta (S, P', X) in (S^*, P'^*, X) . Se un triangolo ciclico è parte di $(P)^X$, allora l'immagine di esso secondo $\Theta\Omega$ — come si vede facilmente — sarà anche triangolo ciclico in $(P'^*)^{X^*}$, e viceversa. Dunque — mediante la trasformazione $\Theta\Omega$ — si vede che dalle (2.1), (2.2) discende (1.1).

4. — Per svolgere il presente studio è opportuno premettere alcune proposizioni, in parte note. Cfr. Kárteszi [1], Harary [2], Busacker-Saaty [3].

Sfruttando l'applicazione $\Theta\Omega\Gamma$ (dove Γ denota la simmetria centrale di centro X^*) si può dimostrare il teorema (1.1) indipendentemente dal teorema (2.1), (2.2).

Per ottenere il risultato nel caso generale, basta considerare il caso particolare:

$$S = S^*, X^* = X, P'^* = P' = P, (P'^*)^{X^*}$$

(fig. 4), dove S è un $2n$ -gono regolare e

$$S_{v_1} S_{v_2} \dots S_{v_n} = P_1 P_2 \dots P_n = P,$$

Fig. 4.

inoltre Q_k indica il punto opposto di P_k . Gli spigoli del grafo completo orientato $(P)^X$ sono le corde orientate $P_j P_k$ ($j \neq k$) di Γ .

In un grafo orientato vi sono due tipi di spigoli per ogni vertice P_k . Corrispondentemente avremo due gradi locali: il numero $\varrho^+(k)$ di spigoli uscenti e il numero $\varrho^-(k)$ di spigoli entranti. Si vede facilmente che:

$$(4.1) \quad \varrho^+(k) + \varrho^-(k) = n - 1, \quad n \geq k \geq 1;$$

$$(4.2) \quad \sum_{k=1}^n \varrho^+(k) = \sum_{k=1}^n \varrho^-(k) = \binom{n}{2}.$$

Un triangolo transitivo possiede precisamente un vertice in cui s'incontrano due spigoli uscenti (lati del triangolo); similmente, esso possiede precisamente un vertice in cui s'incontrano due spigoli entranti. Contando punto per punto le coppie di tali spigoli, si ottiene il numero dei triangoli transitivi in $(P)^X$:

$$(4.3) \quad \sum_{k=1}^n \binom{\varrho^+(k)}{2} = \sum_{k=1}^n \binom{\varrho^-(k)}{2}.$$

I triangoli ciclici, e soltanto essi, contengono all'interno il centro X . Abbiamo dunque la relazione:

$$(4.4) \quad f(P, X) = \binom{n}{3} - \sum_{k=1}^n \binom{\varrho^+(k)}{2}.$$

Ora introduciamo un certo numero che poi ci verrà utile.

Sia $S^{(k)} = \{S_k, S_{k+1}, \dots, S_{k+n-1}\}$ - se $t > 2n$, allora è lecito scrivere $S_t = S_{t-2n}$ - e consideriamo il numero dei punti di $P \cap S^{(k)}$, che verrà denotato con $g(k) - k = 1, 2, \dots, 2n$ -.

Dalla definizione di $g(n)$ si vede facilmente che:

$$(4.5) \quad g(k) + g(k+n) = n, \quad n \geq k \geq 1;$$

$$(4.6) \quad |g(k+1) - g(k)| = 1, \quad 2n \geq k \geq 1;$$

$$(4.7) \quad g(k) = \varrho^+(l) + 1, \quad \text{se } S_k = P_l;$$

$$(4.8) \quad g(k) = \varrho^-(l), \quad \text{se } S_k = Q_l.$$

Sfruttando le (4.3) e (4.4), con un breve calcolo risulta

$$\begin{aligned} f(P, X) &= \binom{n}{3} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\binom{\varrho^+(k)}{2} + \binom{\varrho^-(k)}{2} \right) = \\ &= \binom{n}{3} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n (\varrho^{+2}(k) + \varrho^{-2}(k) - \varrho^+(k) - \varrho^-(k)). \end{aligned}$$

Tenuto conto delle (4.1), (4.7), (4.8), si può scrivere questa relazione nella forma:

$$(4.9) \quad f(P, X) = \binom{n+1}{3} + \frac{1}{4} \left(n - \sum_{k=1}^n g^2(k) \right).$$

Da (4.5) segue:

$$(4.10) \quad \sum_{k=1}^n g(k) = n^2.$$

Poggiando sulle precedenti convenzioni e relazioni, si vede che la somma dei numeri $g^2(k)$ per $k = 1, 2, \dots, 2n$ ammette il minimo valore — in virtù di (4.5) — se la decomposizione del numero n^2 in $2n$ parti risulta al massimo grado equabile. Ne discende senza difficoltà il teorema (1.1).

E. BOROS e F. FÜREDI.

BIBLIOGRAFIA

- [1] F. KÁRTESZI, *Extremalaufgaben über endlichen Punktsysteme*, « Publications Mathematicae », Debrecen, 4, 1955.
- [2] F. HARARY, *The theory of tournaments: a miniature mathematical system*, « Colloquium Math. », XV, 1, 1966.
- [3] R. G. BUSACKER e T. L. SAATY, *Finite Graphs and Networks an Introduction with Applications*, Mc Graw-Hill Book Company, New York.

ALTERNARSI DELLA CERTEZZA E DEL DUBBIO.

« L'uomo che comincia con certezza, finisce nel dubbio. Ma colui che comincia nel dubbio finisce con la certezza ».

FRANCIS BACON.